Milieux : interactions, interfaces, homogénéité, ruptures :

Dynamique des populations : Etude du risque de surpopulation

Lycée La Salle St Charles, Saint-Pierre, 97410
2017/2018
MP

Dubard Loïc
Monnier Clément
Alcaraz Angelo

Plan:

I) Approche naïve

II) Création de modèles

III) Analyse des taux et tests

Plan:

I) Approche naïve

II) Création de modèles

III) Analyse des taux et tests

I) Approche naïve

a) Modèle discret

Modèle de Leslie :

$$\text{On pose : } \forall n \in \mathbb{N} : U_n = \begin{pmatrix} u_1^{(n)} \\ u_2^{(n)} \\ \vdots \\ u_p^{(n)} \end{pmatrix}$$

où $u_i^{(n)}$ désigne la population au pas de temps n de la classe d'âge i

I) Approche naïve

a) Modèle discret

Modèle de Leslie :

$$\forall k \in [[1, 2p]] : s_k = 1 - r_k - m_k$$

Où r_k : rapport du nombre de personne de la classe k

qui reste dans la même classe au pas de temps suivant sur le nombre d'individu de la classe

f_k : taux de fécondité pour la classe k

m_k : taux de mortalité pour la classe k

I) Approche naïve

a) Modèle discret

Équation pour chaque classe au temps $n+1$ en fonction des effectifs au pas de temps n :

$$\forall n \in \mathbb{N} : u_1^{(n+1)} = f_1 u_1^{(n)} + \dots + f_p u_p^{(n)} + r_1 u_1^{(n)}$$

$$\forall (n, k) \in \mathbb{N} \times [[2, p]] : u_k^{(n+1)} = r_k u_k^{(n)} + s_{k-1} u_{k-1}^{(n)}$$

Équation matricielle de Leslie

$$\forall n \in \mathbb{N} : U_{n+1} = L U_n$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : U_n = L^n U_0$$

Où $L \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est de la forme :

$$\begin{pmatrix} f_1 + r_1 & f_2 & f_3 & \dots & f_p \\ s_1 & r_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & s_2 & r_3 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & s_{p-1} & r_p \end{pmatrix}$$

I) Approche naïve

a) Modèle discret

Théorème de Perron- Frobenius :

Théorème *Perron-Frobenius*

Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à coefficients positifs et primitive. Il existe X un vecteur propre pour M à coordonnées strictement positives et associé à $\rho \in \mathbb{R}^+$ tel que :

$$\rightarrow \dim(\text{Ker}(M - \rho I_n)) = 1$$

$$\rightarrow \forall \lambda \in \text{Sp}(M), |\lambda| \leq \rho$$

On appelle rayon spectral de M le réel ρ mis en évidence.

I) Approche naïve

a) Modèle discret

Théorème de Perron- Frobenius :

Corollaire Soit M une matrice de Leslie de taille n et ρ son rayon spectral donné par théorème de Perron-Frobenius. On note $X_0 \in \mathbb{R}_+^n$ le vecteur représentant la population initiale suivant n classes d'ages. Si on définit $(X_p)_{p \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall p \in \mathbb{N}, X_{p+1} = M X_p$.

$$\text{Alors } \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sum_{1 \leq k \leq n} (X_{p+1})_k}{\sum_{1 \leq k \leq n} (X_p)_k} \right) = \rho.$$

I) Approche naïve

a) Modèle discret

Théorème de Perron- Frobenius :

Corollaire Soit M une matrice de Leslie de taille n et $\rho > 0$ son rayon spectral donné par théorème de Perron-Frobenius. On note (X_n^i) l'effectif de la i -ème classe au temps n , tout cela étant défini par la relation de récurrence :

$$\forall i \in \{1, \dots, p\}, \forall n \in \mathbb{N}, X_{n+1}^i = M X_n^i$$

Alors l'un des trois cas suivants est envisageable:

$\rho > 1$ l'effectif de la population diverge exponentiellement vers $+\infty$.

$\rho = 1$ l'effectif de la population converge vers une configuration stable égale au vecteur propre associé à ρ , noté X_0 .

$\rho < 1$ l'effectif de la population décroît exponentiellement vers 0.

I) Approche naïve

a) Modèle discret

Vérification des hypothèses sur la population mondiale :

$$\rho > 1,019 > 1$$

Donc la population mondiale devrait diverger exponentiellement.

Evolution de la population mondiale en 100 classes d'âges selon le modèle de Leslie
(temps discret)

l) Approche naïve

b) *Modèle continu*

Equation de Mc Kendrick- Von Foerster :

$n(t, a) \longrightarrow$ densité de population dépendant du temps t et de l'âge a .

$P(t) = \int_0^{\infty} n(t, a) \longrightarrow$ population à l'instant t

$\mu(t, a), \phi(t, a) \longrightarrow$ taux de mortalité et de fertilité

I) Approche naïve

b) Modèle continu

Equation de Mc Kendrick- Von Foerster :

Durant un temps dt , il meurt $\mu(t, a) n(t, a) dt$ personnes.

On a donc : $dn(t, a) = \frac{\partial n}{\partial t} dt + \frac{\partial n}{\partial a} da = -\mu(t, a) n(t, a) dt$

$da \approx dt \Rightarrow$ $\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial n}{\partial a} = -\mu(t, a) n(t, a) dt$ (équation de McKendrick-Von Foerster)

I) Approche naïve

b) *Modèle continu*

Equation de Mc Kendrick- Von Foerster:

1. Les taux de fertilité et de mortalité sont constants au cours du temps
2. $n(0, a) = n_0(a)$ (distribution initiale en age)
3. $\forall t \in \mathbb{R}_+ : n(t, 0) = \int_0^\infty \phi(a) n(t, a) da$ (naissances au temps t)

I) Approche naïve

b) Modèle continu

Forme semi-résolue de la densité de population :

$$n(t, a) = f(t - a) \exp\left(-\int_0^a \mu(\varphi) d\varphi\right)$$

Solution de l'équation :

Avec L_f la transformée de Laplace de f , et $M: a \rightarrow \phi(a) \exp\left(-\int_0^a \mu(\varphi) d\varphi\right)$, on a :

$$L_f(\lambda) = \frac{1}{1 - L_M(\lambda)} \int_0^\infty M(a) \exp(-\lambda a) da \int_{-a}^0 n_0(-u) \exp\left(\int_0^{-u} \mu\right) \exp(-\lambda u) du$$

I) Approche naïve

b) Modèle continu

Ainsi on observe ici $L=0$

Donc d'après l'étude précédente la population finale décroît jusqu'à s'éteindre

Plan:

I) Approche naïve

II) Création de modèles

III) Analyse des taux et tests

II) Création de modèles

Améliorations/Hypothèses:

- Etude d'un pays
- Prise en compte de l'immigration/émigration
- Hypothèse des taux presque constants
- Séparation des classes homme et femme
- Prise en compte d'un taux de rencontre

II) Création des modèles

Distinction homme/femme, prise en compte de l'immigration :

Femmes :

Hommes :

II) Création des modèles

a) Modèle discret

Présentation des variables :

On pose : $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \begin{pmatrix} u_1^{(n)} \\ u_2^{(n)} \\ \vdots \\ u_p^{(n)} \end{pmatrix}$ où les termes impairs désignent les femmes

et les termes pairs les hommes.

$$\forall k \in [[1, 2p]] : s_k = 1 - r_k - m_k - e_k$$

Où e_k : taux d'émigration pour la classe k

i_k : taux d'immigration pour la classe k

II) Création des modèles

a) Modèle discret

Equation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} u_1^{(n+1)} = \frac{f_1}{2} u_1^{(n)} + \frac{f_2}{2} u_3 + \dots + \frac{f_k}{2} u_{2k-1} + \dots + \frac{f_p}{2} u_{2p-1} + (r_1 + i_1) u_1^{(n)} \\ u_2^{(n+1)} = \frac{f_1}{2} u_1^{(n)} + \frac{f_2}{2} u_3 + \dots + \frac{f_k}{2} u_{2k-1} + \dots + \frac{f_p}{2} u_{2p-1} + (r_2 + i_2) u_2^{(n)} \end{cases}$$

$$\forall (n, k) \in \mathbb{N} \times [[3, 2p]] : u_k^{(n+1)} = (r_k + i_k) u_k^{(n)} + s_{k-2} u_{k-2}^{(n)}$$

II) Création des modèles

a) Modèle discret

Equation pratique :

Ainsi maintenant, $L \in \mathcal{M}_{2p}(\mathbb{R})$ est de la forme :

$$\begin{pmatrix} \frac{f_1}{2} + i_1 + r_1 & 0 & \frac{f_2}{2} & \dots & \frac{f_p}{2} & 0 \\ \frac{f_1}{2} & i_2 + r_2 & \frac{f_2}{2} & \dots & \frac{f_p}{2} & 0 \\ s_1 & 0 & i_3 + r_3 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & i_4 + r_4 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & s_{p-1} & 0 & i_{2p} + r_{2p} \end{pmatrix}$$

f_k désigne le nombre d'enfants par individu pour la classe k (hommes + femmes)

Avec toujours : $\forall n \in \mathbb{N} : U_{n+1} = LU_n$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : U_n = L^n U_0$$

II) Création des modèles

a) Modèle discret

Introduction d'une probabilité de rencontre :

$$\forall n \in \mathbb{N} : \begin{cases} u_1^{(n+1)} = \sum_{k=1}^p \frac{f'_k u_{2k}^{(n)}}{2(u_{2k-1}^{(n)} + u_{2k}^{(n)})} u_{2k-1}^{(n)} + (r_1 + i_1) u_1^{(n)} \\ u_2^{(n+1)} = \sum_{k=1}^p \frac{f'_k u_{2k}^{(n)}}{2(u_{2k-1}^{(n)} + u_{2k}^{(n)})} u_{2k-1}^{(n)} + (r_2 + i_2) u_2^{(n)} \end{cases}$$

$$\forall (n, k) \in \mathbb{N} \times [[3, 2p]] : u_k^{(n+1)} = (r_k + i_k) u_k^{(n)} + s_{k-2} u_{k-2}^{(n)}$$

$$\text{Où } \forall k \in [[1, p]] : f'_k = f_k \frac{u_{2k-1}^{(0)} + u_{2k}^{(0)}}{u_{2k}^{(0)}}$$

II) Création des modèles

a) Modèle discret

Structure du programme :

```
GUI.py
├── Fenetre
│   ├── _init_
│   ├── log
│   ├── parcourir
│   ├── parcourirpopulation
│   ├── parcourirmortalite
│   ├── parcourirfecondite
│   ├── parcouriremigration
│   └── parcouririmmigration
└── callback
if __name__=="__main__":
```

II) Création des modèles

a) Modèle discret

Structure du programme :

- ▼ modelediscret.py
 - ▼ ouverturefichier
 - > with open(pop,"r") as fichier:
 - > with open(mort,"r") as fichier:
 - > with open(fec,"r") as fichier:
 - > with open(em,"r") as fichier:
 - > with open(im,"r") as fichier:
 - mat-survie
 - > mat-immigration
 - matrice
 - > Leslie
 - > fonction
 - > ecart
 - > tracer
 - > matriciel
 - > tableau
 - enregistrement

transition_donnees_11pays_1950a2015.csv

emigrationfrance1998_2015.csv

feconditefrance1998_2015.csv

immigrationfrance1998_2015.csv

mortalitefrance1998_2015.csv

populationfrance1998_2016.csv

tauxfecondite_par_age_par_pays_europe_2008a2015.csv

II) Création de modèles

a) Modèle discret

Evolution d'une population en 100 classes d'âges selon le modèle de notre composition (temps discret)

II) Création de modèles

a) Modèle discret

Evolution d'une population en 100 classes d'âges selon le modèle de notre composition (temps discret avec proba de rencontre)

II) Création de modèles

a) Modèle discret

Evolution de l'écart relatif de chaque classe d'âge en fonction du temps de 0 à 85 ans (avec proba)

Evolution de l'écart relatif de chaque classe d'âge en fonction du temps de 0 à 85 ans (sans proba)

Amélioration de l'écart relatif (non visible sur les graphiques) sur la population totale en france au bout de 9 ans de moins de $8e-05$ points

II) Création de modèles

b) *Modèle continu*

Choix du modèle :

$(h_k)_{1 \leq k \leq p}$ (respectivement $(w_k)_{1 \leq k \leq p}$) : suites de fonctions associées à la population des hommes (respectivement femmes)

$$\forall t \in \mathbb{R}^+ : \begin{cases} h_1(t + dt) = \sum_{k=1}^p \frac{f_k}{2} w_k(t) + (r_1^{(h)} + i_1^{(h)}) h_1(t) \\ w_1(t + dt) = \sum_{k=1}^p \frac{f_k}{2} w_k(t) + (r_1^{(w)} + i_1^{(w)}) w_1(t) \end{cases} \quad (1)$$

$$\forall (t, k) \in \mathbb{R}^+ \times [[2, p]] : \begin{cases} h_k(t + dt) = (r_k^{(h)} + i_k^{(h)}) h_k(t) + s_{k-1}^{(h)} h_{k-1}(t) \\ w_k(t + dt) = (r_k^{(w)} + i_k^{(w)}) w_k(t) + s_{k-1}^{(w)} w_{k-1}(t) \end{cases}$$

$$\forall (t, k) \in \mathbb{R}^+ \times [[1, p]] : \begin{cases} dh_k(t) = h_k(t + dt) - h_k(t) \\ dw_k(t) = w_k(t + dt) - w_k(t) \end{cases}$$

II) Création de modèles

b) Modèle continu

Introduction de la probabilité de rencontre :

$$\forall t \in \mathbb{R}^+ : \begin{cases} h_1(t + dt) = \sum_{k=1}^p \frac{f'_k h_k(t)}{2(w_k(t) + h_k(t))} w_k(t) + (r_1^{(h)} + i_1^{(h)}) h_1(t) \\ w_1(t + dt) = \sum_{k=1}^p \frac{f'_k h_k(t)}{2(h_k(t) + w_k(t))} w_k(t) + (r_1^{(w)} + i_1^{(w)}) w_1(t) \end{cases}$$

II) Création de modèles

b) Modèle continu

Résolution :

Résolution numérique par la méthode de Runge kutta 4 d'une équation de la forme : $U'(t) = F(U, t)$ où ici :

$$U : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^{2p}$$
$$t \mapsto \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_{2p}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_1(t) \\ h_1(t) \\ \vdots \\ w_p(t) \\ h_p(t) \end{pmatrix}$$

II) Création de modèles

b) Modèle continu

Evolution d'une population en 100 classes d'âges selon le modèle de notre composition (temps continu : 1000 valeurs)

Evolution d'une population en 100 classes d'âges selon le modèle de notre composition (temps discret)

II) Création de modèles

b) Modèle continu

Evolution d'une population en 100 classes d'âges selon le modèle de notre composition (temps continu : 1000 valeurs avec proba de rencontre)

Evolution d'une population en 100 classes d'âges selon le modèle de notre composition (temps discret avec proba de rencontre)

Evolution discrète de l'écart relatif de chaque classe d'âge en fonction du temps de 0 à 85 ans (sans proba)

Evolution discrète de l'écart relatif de chaque classe d'âge en fonction du temps de 0 à 85 ans (avec proba)

Evolution continue de l'écart relatif de chaque classe d'âge en fonction du temps de 0 à 85 ans (sans proba)

Evolution continue de l'écart relatif de chaque classe d'âge en fonction du temps de 0 à 85 ans (avec proba)

La transition démographique

Plan:

I) Approche naïve

II) Création de modèles

III) Analyse des taux et tests

III) Analyse des taux et tests

a) Variation des taux en fonction de l'âge :

Choix du modèle :

$$f(x, t) = A(t) \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Répartition du taux de fertilité en fonction de l'âge

Répartition du taux de mortalité en fonction de l'âge

III) Analyse des taux et tests

a) Variation des taux en fonction de l'âge :

Méthodes informatique et résultats :

```
ecart_type.py
> e_t
calcul_ecart
gauss
moy
> float_the_list
calculparametregaussienne
> main
if __name__ == '__main__':
```

Largeur à mi hauteur de la gaussienne : $\Delta x = 2\sigma\sqrt{2\ln(2)}$

III) Analyse des taux et tests

a) Variation des taux en fonction de l'âge :

Méthodes informatique et résultats :

Paramètres de la fonction mortalité :

$$\begin{cases} \lambda = \frac{\ln(y_{85}/y_5)}{80} \\ A = \frac{y_5}{\exp(5\lambda)} \end{cases}$$

III) Analyse des taux et tests

b) Variation des taux en fonction du temps durant la transition

Explication du modèle :

- Approximation linéaire basée sur l'exemple par détermination d'un taux d'équilibre haut moyen et d'un taux d'équilibre bas moyen : la "droite des taux"

III) Analyse des taux et tests

b) Variation des taux en fonction du temps durant la transition

Variation du nombre d'enfants pour 1000 femmes en fonction du temps en transition démographique

Variation du nombre d'enfants pour 1000 femmes en fonction du temps en transition démographique

III) Analyse des taux et test

b) Variation des taux en fonction du temps durant la transition

Variation du taux de mortalité moyen en fonction du temps durant la transition

Variation du taux de mortalité moyen en fonction du temps durant la transition

III) Analyse des taux et tests

Evolution des taux de mortalité en fonction de l'âge et du temps

Evolution des taux de fécondité en fonction de l'âge et du temps

Conclusion

Evolution de la population mondiale en 100 classes d'âges selon le modèle de Leslie
(temps discret avec une transition de 10 ans)

Conclusion

Evolution de la population mondiale en 100 classes d'âges selon le modèle de Leslie
(temps discret avec une transition de 20 ans)

Conclusion

Evolution de la population mondiale en 100 classes d'âges selon le modèle de Leslie
(temps discret avec une transition de 30 ans)

Conclusion

Evolution de la population mondiale en 100 classes d'âges selon le modèle de Leslie
(temps discret avec une transition de 40 ans)

Conclusion

Modèle applicable à tout pays en présence:

- Du taux de fécondité maximum
- Du taux de mortalité à 5 ans et 85 ans
- Des taux d'immigration et d'émigration par classe d'âges